ПАМЯТКА

владельцам животных о мерах по профилактике и ликвидации ящура



ЯШУР (афтозная лихорадка) – острое инфекционное заболевание животных, главным образом крупного рогатого скота, коз и свиней, выражающееся в лихорадке и образовании сыпи в виде пузырьков (афт) на слизистой полости рта и на коже в области копытец.

Болеет ящуром и человек.

Наиболее подвержены заболеванию молодые животные, у которых ящур протекает тяжело в острой форме и с массовой гибелью до 60 %. Эта болезнь может принимать широкое распространение среди животных в виде эпизоотий.

Источником инфекции являются больные ящуром животные, в том числе находящиеся в скрытом периоде течения болезни, который обычно длится от 1 до 7 дней, иногда до 21 дня. Такие животные выделяют вирус во внешнюю среду в основном с молоком, слюной, мочой и калом. Источником возникновения заболевания животных ящуром являются необезвреженные продукты и сырье, полученные от больных ящуром животных, а также загрязненные выделениями больных животных корма, вода, подстилка, предметы ухода, одежда и обувь людей, транспортные средства, на которых вирус ящура способен длительно сохраняться и передвигаться на значительные расстояния.

Возбудитель РНК-содержащий вирус очень чувствителен к нагреванию: в молоке при 100°С он погибает в течение 5 минут, а при пастеризации молока 70°С – в течение 30 минут. Возбудитель ящура по устойчивости к химическим дезинфицирующим средствам относится к устойчивым (2-я группа).

В сточных водах в холодное время года выживает до 103 дней, в летнее - 21 день, осенью - 49 дней. На шерстном покрове животных вирус сохраняется до 50 дней, на одежде - до 100, в помещениях - до 70, в кормах - до 30...150, почве - до 40...150, в свежем молоке (4°С) - до 15, в колбасах - до 56 дней. В соленых и копченых продуктах - до 50 дней. В быстрозамороженном мясе (ниже - 20 °С) вирус может сохраняться годами.

Клинические признаки заболевания. У крупного рогатого скота инкубационный период ящура продолжается в среднем 6 – 8 дней с колебаниями от 16 ч до 20 дней. Различают две формы ящура у животных: доброкачественную, с легким течением и злокачественную, отличающуюся более тяжелым течением.

Памятка для населения по профилактике ящура животных



ЯЩУР – остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных животных.

Клинические признаки заболевания:

наличие везикул и эрозий на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытцевой щели, носового зеркала, вымени (молочных желез). У больных восприимчивых животных наблюдаются слюнотечение, повышение температуры тела, хромота и снижение аппетита.

Фактор передачи вируса: продукция животного происхождения, корма, одежда и обувь персонала, обслуживающего восприимчивых животных, инвентарь и иные материально-технические средства, контаминированные вирусом.
Инкубационный период болезни составляет до 14 календарных дней.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

- **извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или заболевания восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;**
- **принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также восприимчивых животных, находящихся в контакте с подозреваемыми в заболевании ящером восприимчивых животных, обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных;**
- **выполнять требования специалистов госветслужбы в хозяйствах в которых содержатся восприимчивые животные;**
- **соблюдать условия, запрета, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру;**
- **не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое.**

ВАЖНО!!! Основной путь инфицирования людей – через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. От человека к человеку инфекция не передается. Распространение ящура приводит к масштабному выбытию продуктивных животных, значительному экономическому ущербу, снижению экспортного потенциала страны, инвестиционной привлекательности отрасли АПК.

Памятка по профилактике возникновения и распространения Ящура животных



Ящур – острое вирусное заболевание КРС, свиней, овец, коз.

Основные пути заражения:

- Контакт с больными животными.
- Загрязненные корма, вода, транспорт.
- Укусы кровососущих насекомых (слепни).

Симптомы Ящура:

- Язвы во рту, на языке, вымени.
- Обильное слюнотечение, отказ от корма.
- Хромота (язвы между копытами).
- Лихорадка, вторичные инфекции.

**Без лечения смертность молодняка – до 90%!*